

秦野赤十字病院 がん化学療法レジメン

胆道・膵臓がん

レジメン名称	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日	1クール期間
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	d1、8、15	28日間
nab-PTX+GEM	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	30分 30分	d1、8、15 d1、8、15	28日間
mFOLFIRINOX	エルプラット レボホリナート イリノテカン 5-FU	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 1時間30分 46時間	d1 d1 d1 d1-3	14日間
nal-IRI+5-FU/LV	オニバイド レボホリナート 5-FU	70mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2,400mg/m <sup>2</sup>	90分 2時間 46時間	d1 d1 d1-2	14日間
GS	ゲムシタビン S-1	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	30分 内服	d1、8 d1夕-d15朝	21日間
NAC GS	ゲムシタビン S-1	1000mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	30分 内服	d1、8 d1夕-d15朝	21日間